

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-3-73 496421

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 86-22-75)

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

ABONNEMENT ANNUEL

30,00 Francs

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 150 de Mars 1973

1973 - 9

TAVELURE DU POIRIER

Les pluies des 24 et 25 mars ont provoqué des projections d'ascospores assez importantes qui pourraient être à l'origine des premières contaminations dans les vergers non traités, sur variétés à débourrement précoce, en particulier dans les Landes. Toutefois, en raison des températures assez basses qui ont régné pendant la période d'humectation des organes sensibles des poiriers, les infections devraient être légères.

Actuellement, l'ensemble des variétés de poiriers a atteint ou dépassé le stade de sensibilité C₃ - D et chaque nouvelle précipitation maintenant la végétation mouillée pendant plus de 15 heures est susceptible de déclencher une contamination.

En conséquence, il est indispensable de prévoir un traitement fongicide généralisé des vergers de poiriers avant la fin de la semaine.

TAVELURE DU POMMIER

Les premières projections d'ascospores, faibles, ont été observées au cours de la pluie du mercredi 28 mars.

L'évolution de la végétation varie pour une même variété suivant les types de sols, les porte greffes et les expositions. Cependant on peut considérer que d'une manière générale, les "Red américaines" ont atteint à peu près partout le stade C₃ - D et doivent être traitées avant la fin de la semaine. Il en est de même pour les vergers de Golden dans le département des Landes.

Par contre, en Lot et Garonne, en Gironde et dans la vallée de la Dordogne, seuls les golden greffées sur Paradis ou sur Franc sont au stade C₃ - D. Elles doivent être également traitées rapidement.

Dans les autres cas, et en particulier dans le Nord du département de la Dordogne, la végétation ne dépasse pas le stade C. Le Traitement peut dans ces conditions être repoussé à la semaine prochaine. Il sera appliqué au fur et à mesure de l'apparition du stade sensible C₃ - D.

Cenon, le 28 Mars 1973

L'Ingénieur d'Agronomie
et l'Ingénieur des Travaux Agricoles
J. TOUZEAU - C. VENEQUE

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Aquitaine"
M. LARGE

Imprimerie de Station de Bordeaux
Directeur-Gérant : L. BOUYX

P13

DEVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS 13

Tableau n° 1 — STADES-REPÈRES DU POIRIER.

